

NOUVEAUX CRYPTOCEPHALIDES D'AFRIQUE [COL.],

PAR M. M. PIC,

(1^{re} Partie.)

Les Coléoptères Phytophages faisant l'objet du présent article font partie des collections du Muséum National de Paris; ils proviennent de différents récolteurs et de régions diverses. N'ayant pas pu voir les tarses de certains exemplaires (les pattes des sujets étudiés étant repliées sous le corps, ou engluées de colle), donc ignorant si les ongles sont dentés ou non, j'ai dû classer ceux-ci avec quelque doute (en me contentant d'une comparaison extérieure avec les formes connues); ce sont les suivants : *Cryptocephalus atriceps* et *Melixanthus Lamyi*.

Je n'ai vu qu'un exemplaire pour chacune des nouveautés qui suivent, à l'exception de *A. inflatus* v. *nigrolineatus* ⁽¹⁾.

Isnus Chevalieri nov. sp.

Subovatus, nitidus, piceo-aenescens, labro, elytris, membris, abdomine apice pygidioque testaceis.

Subovalaire, large, brillant de poix à reflets bronzés avec le labre, les élytres, ceux-ci un peu rembrunis vers l'écusson, les membres, le sommet de l'abdomen et du pygidium testacés. Yeux gris, grands, un peu écartés sur le vertex qui est presque lisse; prothorax court et large, un peu rétréci en avant, à ponctuation pas très fine, un peu espacée, à lobe postérieur médian petit et étroit, subtriangulaire; écusson distinct, de forme allongée; élytres courts et larges, de la largeur du prothorax, non rétrécis en arrière, subarrondis séparément au sommet, à ponctuation en partie disposée en rangées non absolument uniformes, pas très forte et ornés de 3 stries latérales, l'interne plus courte.

Long. 1 millim. 5.

Guinée Française : Dalaba, déc. 1910 (A. Chevalier).

Peut se placer près de *I. biserialatus* Chp. dont la coloration est différente, sans reflets métalliques en dessus.

(1) Un exemplaire de la var. *nigrolineatus* figure dans ma collection.

Isnus atronotatus nov. sp.

Subovatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis elytrisque testaceis, thorace antice nigro-aeneo notato.

Subovalaire, large, brillant, roux testacé avec les antennes, celles-ci un peu obscurcies au sommet, et les élytres testacés, prothorax orné en avant d'une grande macule transversale noire bronzée. Yeux gris, grands, un peu écartés sur le vertex qui est fortement ponctué; prothorax court et large, un peu rétréci en avant, à ponctuation assez forte et rapprochée, à lobe postérieur petit et peu net; écusson à contours non distincts; élytres courts et larges, à épaules un peu marquées, peu rétrécis en arrière, subarrondis séparément au sommet avec des stries antérieures raccourcies et une ponctuation assez forte, en partie irrégulière postérieurement, et 3 fortes stries latérales; antennes plus courtes.

Long. 2 millimètres.

Guinée Française : Dalaba, déc. 1910 (A. Chevalier).

Espèce très distincte par sa coloration et sa structure, faisant le passage aux *Coenobius* Suf. par son écusson indistinct, mais avec les yeux assez éloignés.

Cryptocephalus atriceps nov. sp.

Oblongus, nitidus, testaceus, capite, antennis apice pectoreque nigris.

Oblong, un peu rétréci en arrière, brillant, testacé, le prothorax étant un peu roussâtre par places, avec la tête, le sommet des antennes et la poitrine noires. Prothorax court, un peu rétréci en avant, à ponctuation forte, un peu rapprochée; écusson triangulaire, assez grand, roux foncé; élytres assez courts, atténués postérieurement, à épaules arrondies, à rangées de points assez grands, s'effaçant en arrière, intervalles irrégulièrement et plus finement ponctués avec 2 stries latérales.

Long. 1 millim. 5.

Mozambique : Vallée du Pungnoe, Guengère, juin 1906 (G. Vasse).

Ressemble à *L. minutissimus* Pic distinct à première vue, par sa tête noire.

Cryptocephalus gibbosus nov. sp.

Curtus, elytris gibbosis, viridis, membris pro parte, thorace lateraliter elytrisque luteis, his ad humeros viridi maculatis.

Court, très rétréci postérieurement, en partie opaque; élytres gibbeux vers l'écusson, vert avec partie des membres, bord du prothorax et élytres,

moins le calus huméral vert, d'un jaune paille. Tête rugueuse et un peu creusée entre les yeux; ceux-ci longs, assez rapprochés; antennes longues, noires à base jaune; prothorax court, bombé, à ponctuation profonde, serrée, vert avec une bordure latérale jaune et le repli antérieur roux; écusson allongé, peu ponctué; élytres courts, à épaules et partie derrière l'écusson élevées, à rangées de gros points avec les intervalles en partie plissés; pygidium fortement et rugueusement ponctué; pattes robustes, jaunes avec les cuisses vertes.

Long. 3 millim. 5.

Bechuanaland: Gabarones, sept. 1915 (V. Ellenberger).

A placer près de *C. aggregatus* Jac., très distinct par sa coloration et ses élytres fortement élevés antérieurement vers l'écusson.

Melixanthus Lamyi nov. sp.

Oblongus, nitidus, convexus, rufus, pectore nigro-piceo.

Oblong, un peu rétréci aux deux extrémités, convexe, brillant, roux avec la poitrine d'un noir de poix. Tête fortement ponctué sur le vertex, à ponctuation moins forte et plus écartée; yeux très écartés; prothorax assez court, peu rétréci en avant, à ponctuation espacée, en partie moyenne, rebord latéral rembruni; écusson large, triangulaire, foncé à la base; élytres assez longs, à épaules arrondies, rebord basal foncé et calus huméral un peu rembruni, ornés de rangées de points assez gros, s'oblitérant en arrière avec des stries latérales, intervalles faiblement subalutacés; pattes courtes.

Long. 2 millim. 5.

Bas Chari: Fort Lamy, octobre 1904 (D^r J. Decorse).

Par sa forme rappelle *M. vittulatus* Weise, mais le prothorax est moins court; très distinct par l'absence de dessins noirs sur les élytres et le prothorax.

MELIXANTHUS W. NIGRUM V. NOV. **curtelineatus.**

Elytris in disco et antice late nigris, ad scutellum reducte testaceo lineatis.

Variété très distincte par sa particulière coloration élytrale, celle-ci largement noire offre seulement en coloration claire, sur chacun, une courte ligne basale prescutellaire, une bordure latérale et une macule apicale.

Haute Côte d'Ivoire: environs de Danana, avril 1910 (A. Chevalier).

Melixanthus carinatopygus nov. sp.

Oblongus, nitidus, testaceus, thorace pro parte elytrisque rufo-testaceis.

Oblong, convexe, brillant, testacé avec la majeure partie du prothorax et les élytres d'un roux-châtain. Tête à ponctuation forte, plus écartée sur le front que sur le vertex, impressionnée entre les yeux; ceux-ci moyens, très écartés; antennes assez courtes, épaissies à l'extrémité; prothorax court, rétréci en avant, éparsément ponctué, roux-châtain, orné d'une ligne médiane testacée et également marqué de testacé sur les côtés, bord postérieur noir; écusson grand, triangulaire, jaune, bordé de noir; élytres courts, rétrécis postérieurement, à épaules un peu marquées, bordés de noir à la base, à rangées de points médiocres; intervalles finement et irrégulièrement ponctués; pygidium testacé, caréné au milieu; pattes robustes.

Long. 5 millimètres.

Ogoué: Lambarené, 1913 (R. Ellenberger).

Espèce des plus distinctes par sa coloration jointe à la structure du pygidium.

Anteriscus Bouvieri nov. sp.

Oblongus, nitidus, testaceus, oculis et antennis apice nigris.

Oblong, assez large, convexe, brillant, testacé; yeux et sommet des antennes, noirs. Tête finement et éparsément ponctuée, sillonnée sur le vertex; yeux gris, grands, assez écartés, antennes longues; prothorax court, rétréci en avant, à peine ponctué; écusson grand, triangulaire; élytres de la largeur du prothorax, un peu rétrécis en arrière, pas très longs, à épaules marquées, à rangées de points forts, en partie disposées dans des stries fines, plus marquées latéralement et ayant quelques gros points irréguliers au sommet; pattes assez longues.

Long. 3 millimètres.

Mozambique: Forêt d'Inhacordé, octobre 1907 (G. Vasse).

Ressemble à *A. ferrugineus* W., distinct à première vue par la coloration plus claire et les points des élytres non rembrunis.

ANTERISCUS INFLATUS V. NOV. **nigrolineatus.**

Thorace elytrisque luteis, signaturis nigris ornatis.

Le prothorax a deux courtes lignes noires basales et deux points internes noirs, parfois joints; les élytres ont une ligne discale sinuée, flanquée

antérieurement d'une macule interne, et la suture plus ou moins largement noires. La forme type a les élytres entièrement noirs.

Province du Cap : East London, sept. 1915 (R. Ellenberger).

***Anteriscus Cottesi* nov. sp.**

Oblongus, nitidus, niger, capite, thorace, antennis ad basin, scutello elytrisque apice rufis.

Oblong, un peu rétréci aux deux extrémités, convexe, brillant, noir, avec la base des antennes et le dessus du corps roux, moins la majeure partie des élytres. Tête peu ponctuée, antennes longues; prothorax indistinctement ponctué; élytres à rangées de points médiocres, substriés latéralement, intervalles presque lisses, marqués d'une petite macule apicale rousse; pattes robustes.

Long. 5 millimètres.

Frontière du Congo et du Cameroun; région de Witen 1907 (Capitaine Cottes).

Voisin de *A. Baumannii* Rein. var. *rubricollis* Rein., mais élytres non bordés de roux et seulement marqués de cette coloration au sommet.

***Anteriscus atromaculatus* nov. sp.**

Oblongus, nitidus, luteus, thorace sex (2, 4) elytrisque quinque (1, 2, 2) nigro maculatis.

Oblong, un peu rétréci aux extrémités, convexe, brillant, jaune, orné de macules noires, 6 sur le prothorax disposées en deux rangées et 5 sur chaque élytre; une sur le calus huméral, deux au milieu et deux en dessous du milieu, non obliquement disposées; bord postérieur du prothorax et bord basal des élytres noirs; écusson noir, vaguement marqué de roux. Tête assez fortement ponctuée, sillonnée au milieu; antennes pas très longues, noires au sommet; prothorax à ponctuation fine et écartée; élytres à rangées de points obscurs, substriés latéralement; pygidium fortement ponctué; pattes robustes.

Long. 6 millimètres.

Rhodesia du Sud : Selunkve, 1915 (A. Ellenberger).

Voisin de *A. Barkeri* Jac., coloration générale plus pâle et dessins noirs des élytres différents, maculiformes.